HERBICIDA

AMETRIL 80 WDG

Granulado Dispersable

USO AGRICOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Ingrediente activo:	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
AMETRINA	80 %	----------

Registro MGAP No 3920

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Grupo Químico: Triazinas

Lote No:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:
Contenido neto: **10 Kg**

Registrante: LANAFIL S.A.
Bvar. Artigas 420 oficina 105 - Montevideo

Fabricante: SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co. Ltd.
Origen: CHINA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica:
CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009.
Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua abundante. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al CIAT Tel.: 1722 Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican, manipulan o a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación: Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para aves: **Prácticamente no tóxico** Toxicidad para peces: **moderadamente tóxico.** "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."
Toxicidad para abejas: **Virtualmente no tóxico.** No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros similares.
Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique " CUIDADO☠VENENO "
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS UTENSILIOS DOMÉSTICOS Y VESTIMENTAS.
NOTA: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daos o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.

Lanafil
Cultivando Confianza

HERBICIDA

AMETRIL 80 WDG

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades: AMETRIL 80 WDG es un herbicida del grupo de las triazinas indicado para el control en pre y post-emergencia de malezas que afecten cultivos tales como caña de azúcar, frutales, papa y maíz. Es absorbido por las hojas y las raíces, acumulándose en los tejidos en crecimiento, inhibiendo el transporte de electrones en la fotosíntesis.
AMETRIL 80 WDG es retenido fuertemente en los suelos, quedando en la capa superficial. Su poder residual varía de 1 a 3 meses, actuando contra malezas anuales, gramíneas y latifoliadas, y algunas perennes (de semilla).

Instrucciones de uso:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS kg/ ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN Y FRECUENCIA
	Nombre común	Nombre científico		
Caña de azúcar	Yuyo colorado	*Amaranthus quitensis*	2.5 a 4.0	A la plantación, en pre-emergencia.
	Quinoa	*Chenopodium album*	1.5 a 3.0	Aplicación en post-emergencia dirigida evitando mojar el follaje. Se pueden hacer hasta tres aplicaciones hasta el “cierre” del cultivo. No exceder la dosis de 10 kg/há /año.
	Corrihüela	*Convolvulus arvensis*		
	Sanguinaria	*Polygonum aviculare*		
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*		
	Mostacilla	*Rapistrum rugosum*		
Frutales	Amor seco	*Bidens pilosa*	1.5 a 3.0	Realizar dos aplicaciones por año: a) en primavera, cuando las malezas están en crecimiento y con menos de 10 cm. de altura. b) 3 a 4 meses después de la primera, para lograr un control prolongado.
	Cerraja	*Sonchus oleraceous*		
	Abrojo	*Xantium cavanillesii*		
	Pasto cuaresma	*Digitaria sanguinalis*		
Papa	Gramilla de rastrojo	*Echinocloa colona*	1.5 a 3.0	Hacer la aplicación después de la siembra, pero antes de la emergencia del cultivo.
	Pata de ganso	*Eleusine indica*	1.5 a 5.0	Una aplicación para desecar el cultivo cuando esté maduro y controlar malezas establecidas. Usar 1000 L/ha de agua.
	Gramilla dulce	*Paspalum dilatatum*		
Maíz	Cola de zorro	*Setaria geniculata*	1.0 a 2.5	Aplicar en post-emergencia dirigida a las malezas, después que las plantas de maíz tengan por lo menos 25 cm. de altura. Evitar mojar el follaje del cultivo. Agregar humectante.
	Pasto de quinea	*Panicum maximun*		
PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.				

Modo y método de aplicación: Utilizar equipos de pulverización que aseguren una cobertura homogénea. La cantidad necesaria de AMETRIL 80 WDG se disuelve en un recipiente con agua (balde). Agregar luego esta pre-dilución al tanque de la máquina pulverizadora, con agua hasta la mitad de su capacidad. Con los agitadores en marcha completar el llenado.
No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Con equipos terrestres usar boquillas tipo abanico plano calibrando la máquina para un gasto de 250 L/ha y con equipos aéreos calibrar por lo menos 50 L/ha. En todos los casos se debe asegurar una distribución homogénea sobre el área a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y límite de predios de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y límite de predios de centros educativos.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con otros herbicidas, tanto de contacto como residuales. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Tiempo de espera para cosecha: Todos los cultivos: 45 días.

No pastorear ganado en áreas tratadas en los primeros 21 días después de la aplicación.

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.