Lanafil

OMEX

Boro Plus

FERTILIZANTE FOLIAR DE ALTA CONCENTRACIÓN Y EFICIENCIA, PARA LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE BORO.

Registro MGAP Nº (203/043)

ANÁLISIS MÍNIMO (% peso/peso)

N	P_2O_5 (asimilable)	P_2O_5 (total)	K_2O
4	0	0	0

COMPOSICIÓN

	Peso/volumen (g/L)	Peso/peso (%)
Nitrógeno (N)	65	4.8
Boro (B)	150	11

pH (solución al 10%): 8.0 – 9.0
Densidad: 1.35 – 1.39 g/ml (a 18 °C)

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

10L

Registrante:
LANAFIL S.A.
Bvar. Artigas 420 oficina 105, Montevideo
lanafil.com
Tel: (+598) 2710 1932

Fabricante:
OMEX AGRIFLUIDS LTD.
Origen: Reino Unido

Boro Plus

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES

BORO PLUS es un fertilizante líquido con un alto porcentaje de Boro completamente soluble en agua, especialmente indicado para corregir problemas de carencias de este elemento en varios cultivos. El Boro está involucrado activamente en el transporte de azúcares y en la síntesis del material que conforma las paredes celulares. Los primeros síntomas de falta de Boro incluyen clorosis foliar (amarillamiento) y deformación de las hojas. El Boro también es importante en los procesos de cuajado de frutos ya que incrementa la viabilidad de los granos de polen. Los factores primarios que afectan la disponibilidad de Boro son: el pH del suelo y la humedad. Los suelos secos, con pH mayor a 6.5 deberían ser identificados como de alto riesgo en cuanto a la eficiencia de Boro.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien el envase previo a su apertura. El tanque de la pulverizadora debe de ser llenado hasta la mitad de la cantidad requerida de agua. Agregar la cantidad requerida de BORO PLUS al tanque de la pulverizadora, manteniendo la agitación constante en marcha. Agregar la cantidad remanente de agua para corregir la dilución.

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	DOSIS (cc/100 L)	APLICACIÓN
Manzanas y peras	2.0	200	Dos aplicaciones por estación. La primera luego de caída de pétalo, seguida por otra aplicación 2 a 3 semanas después.
Olivos	2.0	200	Dos aplicaciones, antes y después de floración.
Frutales de carozo	1.0	100	Luego de la cosecha, previo a caída de hoja.
Citrus	2.0	200	Primera aplicación luego de la caída de pétalos y la segunda a las 2 a 3 semanas después.
Uvas	1.0	200	Una o dos aplicaciones en la etapa de floración cuajado.
Soja cereales	1.0	200	Aplicar previo a la floración.
Frutillas	2.0	200	Dos aplicaciones, antes y después de floración.
Zanahorias	2.0	400	Una aplicación en estadio de 6 a 8 hojas, la segunda aplicación 3 semanas después.
Hortalizas	2.0-3.0	400	La primera aplicación en estadio de plantín, cuando haya suficiente área foliar. La segunda aplicación previo a floración.
Remolacha	1.0	600	Primera aplicación en estadio 6-8 hojas. La segunda aplicación 2-3 semanas más tarde, previo a que cierren los surcos.

COMPATIBILIDAD

BORO PLUS es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de fitosanitarios normalmente utilizados en los cultivos recomendados (pesticidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes, etc). Sin embargo, OMEX no puede aceptar la responsabilidad por pérdidas o daños, ya que no todas las combinaciones han sido chequeadas y porque la eficacia de cualquier mezcla depende, entre otros factores, del pesticida involucrado, el estado fenológico, el momento de crecimiento, el clima y los volúmenes de agua utilizados.

PRECAUCIONES

BORO PLUS se debe almacenar en condiciones de temperatura entre 5 y 40ºC. Evitar temperaturas de almacenaje muy bajas. **BORO PLUS** es un fertilizante foliar no inflamable y no peligroso. Sin embargo, se deben usar guantes, lentes y máscaras de protección durante el manipuleo del producto. En situaciones de almacenaje prolongado puede ocurrir un precipitado de los nutrientes. Esta situación es reversible mediante agitado. No almacenar con productos alimenticios, no reutilizar este envase, realizar triple lavado y perforado luego del vaciado. No dejar al alcance de niños o personas irresponsables, manténgase bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: retirar al afectado del área contaminada y buscar atención médica. Ingestión: no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico llevando la etiqueta o el envase. Contacto con la piel: lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Contacto con los ojos: lavar con agua limpia y abundante durante 15 minutos mínimos y buscar atención médica.

ANTIDOTO

No tiene antídoto específico

Nota: El fabricante y sus distribuidores sólo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo y aplicación, así como la dosificación, están fuera de nuestro control.

FECHA DE FORMULACION: FEB 2021 **Nº DE LOTE: 21-28285**

PR1791