VERDE 347 NEGRO - cm 27 x 14

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL.

Antídotos: No tiene antídoto. IPCS/OMS, 2009.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican, manipulan o a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

AVES: **Virtualmente no tóxico.**
PECES: **Virtualmente no tóxico.**
ABEJAS: **Virtualmente no tóxico.**

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente CUIDADO ☠ VENENO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.

REGULADOR DE CRECIMIENTO

Concentrado soluble

Cytokin®

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
Citoquininas	**0.01%**	**0.1 g/L**

Grupo químico: **Hormonas vegetales**

REGISTRO Nº: 2426 - Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Uso agrícola - Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote Nº:

Fecha de fabricación:

Vencimiento:

Contenido neto:

Fabricantes: **Miller Chemical & Fertilizers Corporation.**

Origen: **ESTADOS UNIDOS**

Registrante: **LANAFIL S.A.**

AGROQUIMICOS LANAFIL®

Juan C. Gómez 1492 - Piso 1 - Montevideo - Tel.: 2916 1932* - Fax: 2916 2404
lanafil@lanafil.com www.lanafil.com

RECOMENDACIONES DE USO: LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Generalidades, modo de acción sobre el cultivo: CYTOKIN es un regulador de crecimiento que contiene una hormona vegetal natural (citoquinina), especialmente formulada, que mejora la utilización de los nutrientes, promueve la iniciación y el desarrollo de las yemas, el establecimiento y retención de las flores, el aumento del cuajado y la retención de los frutos.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	EFECTO DESEADO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
TOMATES MORRONES	Aumenta el rendimiento y el contenido en sólidos solubles.	**0,5 L/há.**	Desde el inicio de la floración y hasta un mes antes de la cosecha.
PAPAS	Aumenta el rendimiento y el porcentaje de tubérculos de tamaño grande.	**0,5 L/há.**	Tratamiento foliar: 1º) Antes del inicio de la tuberización. 2º) A los 15 días después.
		0,4 L/há.	Tratamiento de la semilla: al momento de la siembra
CUCURBITÁCEAS	Promueve el crecimiento temprano de los frutos y aumenta el porcentaje de sólidos solubles.	**1 L/há.**	Comenzar a la 5ª hoja y repetir cada 15 días.
FRUTALES MANZANOS, CITRUS	Aumento de rendimiento.	**1 L/há.**	Aplicaciones mensuales y en los siguientes estadios fenológicos: a) Rotura de dormancia. b) Una semana después de pétalo caído. c) 10 a 15 días antes del período de caída de frutos.
UVAS	Mejora de la calidad y el rendimiento.	**0,5 L/há.**	a) Previo a la floración. b) En floración plena. c) Caída de sépalos.
FRUTILLAS	Aumento de rendimiento.	**1 L/há.**	Aplicaciones quincenales desde el trasplante.
HORTALIZAS DE HOJA. (lechuga, espinaca,apio).	Aumento del área foliar	**0,5 L/há.**	Cada 15 días.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Agite bien el envase antes de abrirlo. CYTOKIN se puede aplicar con equipos terrestres (usando un mínimo de 150 litros de agua por há.) o aéreos (usando 30 L./há. como mínimo). Vierta agua en el tanque del equipo aplicador hasta ¾ partes de su capacidad. Agregue la cantidad necesaria de CYTOKIN, diluida en un poco de agua (1 a 5) y, con los agitadores en marcha, completar el llenado con agua. El agregado de un adherente-dispersante como NU-FILM, mejora la eficiencia del producto. Aplicar en las primeras horas de la mañana. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, suburbana, centro poblado o límite de predios de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana, centro poblado o límite de predios de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Compatibilidad y fitotoxicidad: Compatible con otros agroquímicos normalmente usados en los cultivos recomendados (fungicidas, insecticidas o fertilizantes foliares). No aplicar con temperaturas mayores a 36 º C ni cuando se esperan lluvias dentro de las ocho horas siguientes al tratamiento.

Tiempo de espera: 1 día.

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.

CUIDADO

G0920113