

VERDE 347

NEGRO - cm 10.5 x15

# HERBICIDA KLEEN 75 WDG

Ingrediente activo: en peso:  
**CLORSULFURON.....75%**

Registro: Nº 3058 - Producto autorizado por el  
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca  
Fabricante: FERTIAGRO PTE LTD.

**Granulos Dispersables** LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Grupo Químico: **Sulfonilureas**

Origen: CHINA Registrante: LANAFIL S.A.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta  
USO AGRICOLA

Lote:

Fecha de vencimiento:

Fecha de fabricación:

CONTENIDO NETO:

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Clasificación Toxicológica:** POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2009.

**Antídotos:** No tiene antídoto.

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión, NO provocar el vómito. Contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua abundante y jabón. Contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELEFONO 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Peces: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Abejas: LIGERAMENTE TÓXICO. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días.

Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

**Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases al centro de acopio más cercano.

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO ☹️, VENENO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS.

**Lanafil** 

Bvar. Artigas 420 Ol.105 - Montevideo - Tel.: 2710 1932  
lanafil@lanafil.com - www.lanafil.com



CUIDADO



G 102018

# KLEEN 75 WDG

## RECOMENDACIONES DE USO

**Generalidades:** KLEEN 75 WDG es un herbicida selectivo de acción residual que controla las malezas de hoja ancha en cereales y lotus, indicadas en esta etiqueta. KLEEN 75 WDG tiene acción sistémica ascendente y descendente; es absorbido por vía radicular y foliar. Es un herbicida del grupo de las sulfonilureas, su modo de acción es inhibir la enzima precursora de la biosíntesis de los aminoácidos esenciales, valina e isoleucina. Inhibe el crecimiento en los brotes y los ápices de las raíces de las plantas sensibles.

### Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (g/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN	MALEZAS CONTROLADAS	
			Nombre común	Nombre científico
TRIGO ( <i>Triticum aestivum</i> ) AVENA ( <i>Avena sativa</i> ) CEBADA ( <i>Hordeum vulgare</i> )	15 a 20	Post emergencia a partir de 3 hojas verdaderas de las gramineas.	Abrojo Chamico Margarita de Piria (*) Manzanilla Capiquí Calabacilla Mostacilla Rábano Flor morada Cardo negro	<i>Xanthium cavanillesii</i> <i>Datura ferox</i> <i>Coleostephus myconis</i> <i>Anthemis cotula</i> <i>Stellaria media</i> <i>Silene gallica</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Echium plantagineum</i> <i>Cirsium vulgare</i>
TRIGO ( <i>Triticum aestivum</i> )	25 a 30	Pre-emergencia	Flor morada Cardo negro Mastuerzo Lengua de vaca Cardo de castilla Yuyo colorado	<i>Ammi visnaga</i> <i>Coronopus didymus</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Cynara cardunculus</i> <i>Amaranthus quitensis</i>
LOTUS ( <i>Lotus corniculatus</i> )	10	Post emergencia a partir de 5-6 hojas verdaderas		
TRIGO ( <i>Triticum aestivum</i> ) consociado con Lotus ( <i>Lotus corniculatus</i> )	10 a 15	Post emergencia con el lotus con más de 6 hojas y antes del encañado del cereal.		

(\*) Su uso esta indicado dentro de un programa de control integrado de esta maleza.

**Prevención de resistencia:** SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

**Momento de aplicación:** KLEEN 75 WDG puede aplicarse en pre-plantación, pre-emergencia del cultivo o post-emergencia del mismo. También puede ser aplicado en barbecho químico, en mezcla con otro producto registrado para esos usos. Cuando se utiliza en post-emergencia de las malezas, aplicar el producto cuando éstas son jóvenes y están en activo crecimiento.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** KLEEN 75 WDG se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Con equipos aéreos usar por lo menos 20 L de agua/ha. Con equipos terrestres usar un mínimo de 150 litros de agua por hectárea. Mantener los agitadores en funcionamiento durante la aplicación. No efectuar nunca el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados o límites del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados o límites del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

**Contraindicaciones:** No aplicar sobre cultivos en condiciones de stress por sequía o heladas.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** No mezclar con graminicidas. En caso de utilizarlos, dejar transcurrir 10 días entre un tratamiento y otro. Es compatible con la mayoría de los productos herbicidas registrados para uso en cereales (2,4-D AMINA, MCPA, DIURÓN etc.). En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. No mezclar con insecticidas fosforados ni aplicar éstos 14 días antes o después del tratamiento de este producto. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

**Tiempo de espera:** Rotaciones: No se recomienda la siembra de girasol a continuación de un cereal tratado con KLEEN 75 WDG, hasta tanto no haya transcurrido un período de 90-120 días desde la última aplicación, en función de las condiciones del suelo.

**Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 hs.

**Nota:** Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.



CUIDADO



G 102018