

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT , TEL. 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto poco tóxico para aves y abejas, muy tóxico para peces. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase perforéalo para evitar su reutilización.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO ☠ VENENO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.

ADAMA
ESSENTIALS

Merpan 80 DF

Ingrediente activo en peso
Captan 80 %

Grupo químico: Ftalimidas
Granulado Dispersable

FUNGICIDA

Registro: N° 1769

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Lote N°:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento: ver envase

Contenido neto: 1 Kilo

Fabricante:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd.

Origen: ISRAEL

Registrante: LANAFIL S.A.



Bvar. Artigas 420 Of.105 - Montevideo, Uruguay.
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: MERPAN 80 DF es un fungicida de amplio espectro con acción de contacto. Su acción protectora es especialmente valiosa para el control de enfermedades en variedades sensibles de manzanos y peras. Mejora la terminación de la fruta dándole una mejor apariencia y un color más brillante. MERPAN 80 DF actúa en forma preventiva contra enfermedades en los cultivos hortícolas citados en esta etiqueta.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		EPOCA Y APLICACION Y FRECUENCIA
	Nombre Común	Nombre Científico	g/100 L(*)	Kg./Ha	
MANZANOS PERALES	Sarna	Venturia inaequalis	160 - 180	2.0 - 3.0	Aplicar un tratamiento al reventar las yemas. Un tratamiento a la caída de los pétalos. Un tratamiento con frutas cuajadas. Repetir cada 10 días o según las advertencias del Servicio de Alarma. En caso de combinación con fungicidas sistémicos o reducir las dosis a la mitad.
	Sarna	Venturia pirina			
DURAZNOS DAMASCOS CIRUELOS NECTARINAS	Sarna	Fusicladium carpophyllum	160 - 180	2.0 - 3.0	Desde la caída de los pétalos, 2 o 3 tratamientos cada 15 días. Una aplicación al cuajar el fruto. Un mes antes de la cosecha iniciar aplicaciones cada 7 días.
	Podredumbre morena	Monilia fructigena			
VID	Mildiu	Plasmopara viticola	160 - 180	2.0 a 3.0	Empezar cuando los brotes tengan de 8 a 15 cm. de longitud. Seguir semanalmente hasta diciembre. Repetir los tratamientos si se producen lluvias de importancia o ataques fuertes.
CITRUS	Sarna	Sphaceloma fawcettii	160 a 180	2.0	Un tratamiento a flor abierta y otro 20 días después. Un tratamiento un mes después del cuajado. En pomelos es aconsejable un tratamiento en otoño.
	Melanosis	Diaporthe citri			
FRUTILLA	Virus	Mycosphaella fragariae	180	2.0 a 3.0	Desde inicio del rebrote, cada 10 días.
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea			
ARANDANOS	Mildiu	Podospora destructor	150	-----	Desde inicio de rebrote, cada 10 días.
CEBOLLA	Mildiu	Podospora destructor	160 a 180	-----	Aplicar en forma preventiva cada 8 a 10 días.
PAPA TOMATE	Tizón tardío	Phytophthora infestans	120 a 160	1.6 - 2.0	Aplicar cada 8 días desde que las plantas alcanzan 10 centímetros de altura.
ALMIGROS	Mal de almídamo	Pythium sp.	200	-----	Aplicar 2 a 5 lts. de solución por metro cuadrado de almídamo e incorporar en los 10 cm. superficiales del suelo.
POST-COSECHA MANZANA PERA	Podredumbre del almacenamiento	Penicillium expansum	300	-----	Aplicar en baño de postcosecha por inmersión durante 30 segundos a 1 minuto. Repetir 30 g/100 lts. por cada tonelada de fruta tratada. Se puede aplicar MERPAN 80 DF junto con Orientamina. En ese caso, preparar ambos productos en recipientes separados y luego agregarlos al baño y agitar.

(*) Corresponde a pulverizaciones de alto volumen ("a punto de goteo"). En plantaciones adultas, cuando se use equipos que arrojen bajo volumen, (atomizadoras), se deberá mantener la dosis de producto indicada por hectárea.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Utilizar equipos de pulverización que aseguran una cobertura homogénea. La cantidad necesaria de MERPAN 80 DF se agrega directamente al tanque de la máquina pulverizadora, con agua hasta la mitad de su capacidad. Con los agitadores en marcha completar el llenado. Se aplica con equipos terrestres (de alto o bajo volumen), que aseguren una distribución homogénea sobre el follaje a tratar. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Compatibilidad y fitotoxicidad: MERPAN 80 DF puede combinarse con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares normalmente usados en los cultivos indicados, salvo aquellos que sean de reacción fuertemente alcalina. **Es incompatible con aceites y/o azufres.** Puede causar daños en variedades de manzano sensibles como Red Delicious o cultivares relacionados.

Tiempo de espera: Vid: 21 días. Arándanos: 3 días. Otros cultivos: 1 día. En caso de fruta para la exportación, se deberá tener en cuenta el límite máximo de residuos (LMR) del país de destino y el tiempo de espera que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reintegro al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.



CUIDADO

