



# PROPLANT

## USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote N°:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: **5 Litros**

## Concentrado soluble

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
<b>Propamocarb, Clorhidrato de</b>	<b>66,7 %</b>	<b>722 g/L</b>

Grupo químico: **Carbamatos**

Origen: Bélgica

Fabricante: Arysta Lifescience Benelux Sprl.

Registro: N° 2080

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registrante: **LANAFIL S.A.**

Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevidéo

Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Clasificación Toxicológica:** PRODUCTO POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL.

**Antídotos:** Sulfato de atropina al 1 por mil.

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión, NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: **1722**. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Aves: **Ligeramente tóxico**. Peces: **Ligeramente tóxico**. Abejas: **Ligeramente tóxico**. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

**Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfere el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO  VENENO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS.

**Nota:** Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.



CUIDADO





# PROPLANT

## RECOMENDACIONES DE USO

**Generalidades:** PROPLANT es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica ascendente, usado para el control de enfermedades a hongos que atacan papa, tomate, morrón, pepino, melón, frutilla, lechuga, espinaca, cebollas, etc. Se puede aplicar al suelo, (almácigo o cultivo), en baño de plantines o en pulverización foliar.

**Instrucciones de uso:**

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS
	Nombre común	Nombre científico	
PAPA TOMATE	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	250 cc/100 L (1.5 a 2 L/há)
PEPINO MELON	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	250 cc/ 100 L.
CEBOLLA	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	190 cc/100 L.
LECHUGA	Mildiu	<i>Bremia lactucae</i>	250 cc/100 L.
ESPINACA	Mildiu	<i>Peronospora spinaceae</i>	180 cc/100 L.
TOMATE PIMIENTO LECHUGA	Damping off	<i>Phyitium phytophthora</i>	100 cc/100 L. de agua. <u>Almácigos:</u> Aplicar al suelo usando 5 L. de solución por m <sup>2</sup> . <u>Transplante:</u> 100 a 150 cc de solución en la base de la planta.
FRUTILLA	Podredumbre de las raíces	<i>Phyitium sp</i>	150 cc/100 L. Bañar las raíces en la solución antes de plantar.

**Nota:** A efectos de minimizar la aparición de razas resistente se aconseja la aplicación conjunta con FOLPAN 80 DF (1 kg/há).

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** PROPLANT se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad necesaria de PROPLANT al tanque semi-lleno de agua del equipo aplicador, y con los agitadores en marcha, completar al llenado. Se recomienda utilizar equipos terrestres que aseguren una distribución homogénea del producto y una cobertura total del follaje. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

**Momento de aplicación:** En general se recomienda aplicar al momento de aparecer los primeros síntomas de la enfermedad.

**Frecuencia de las aplicaciones:** Aplicaciones cada 7 días. No aplicar más de cuatro tratamientos por ciclo de cultivo.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** Compatible con insecticidas y fungicidas. No aplicar conjuntamente con fertilizantes foliares. Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tiene dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla en el tanque de la aplicadora un test de compatibilidad físico-químico. Además se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción entre los productos no deseada a raíz del uso de dicha mezcla.

**Tiempo de espera para cosecha:** Papa, tomate: 7 días; melón, pimiento: 14 días; otros cultivos: 21 días. **Tiempo de reingreso al cultivo: 24 horas.**



**CUIDADO**

