QUINCLOGAN 50 WG

HERBICIDA

USO AGRÍCOLA
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote Nº:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:
Contenido neto: 1 Kilogramo

Gránulo dispersable

Ingrediente activo:	en peso:
Quinclorac	**50%**

Grupo químico: **Quinolincarboxílico**

Registro: Nº 2538
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Fabricante: Jiangsu Repont Pesticide Factory Co. Ltd.
Origen: China

Lanafil
Registrante: **LANAFIL S.A.**
Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevideo
Tel.: (+598) 2710 1932
lanafil@lanafil.com
lanafil.com

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto, tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y lavar la piel con agua abundante y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL **CIAT TEL: 2-1722**. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Toxicidad para AVES: Prácticamente No tóxico. Toxicidad para ABEJAS: Virtualmente No tóxico. Toxicidad para PECES: MODERADAMENTE tóxico. **"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar"**.

Instrucciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique:
CUIDADO ☠ VENENO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS.

Disposición final del envase: Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple Lavado" del mismo vertiendo el líquido resultante en el tanque del equipo aplicador. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades: QUINCLOGAN 50 WG es un herbicida selectivo, de efecto post-emergente, para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas, en cultivo de arroz. Es especialmente efectivo para controlar todas las especies de capín (*Echinocloa sp.*). Admite mezcla de tanque con otros herbicidas recomendados para usar en arroz. Es un herbicida sistémico, inhibidor de la síntesis de celulosa que se absorbe por las hojas y las raíces de las malezas desde su germinación hasta que tienen de 2 a 4 hojas. Para una óptima actividad herbicida es necesario que exista una buena humedad en el suelo.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	MALEZAS CONTROLADAS		DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
ARROZ	Capin	*Echinocloa crusgalli*	0,5 a 0,9	Riego por inundación después de la aplicación manteniendo una capa de 3 a 5 cm de agua por 5 a 7 días. Cuando las temperaturas son bajas y hay poca actividad fisiológica, usar las dosis máximas.
	Capin	*Echinocloa cruspavonis*		
	Gramilla de rastrojo	*Echinocloa colona*		
	Aeschinomene	*Aeschinomene indica*		
	Gamba rusa	*Alternanthera philoxeroides*		
	Pasto blanco	*Digitaria sanguinalis*		
	Enredadera	*Ipomoea grandifolia.*		
	Brachiaria	*Brachiaria platyphylla*		
	Sesbania	*Sesbania arginata*		

Prevención de resistencia: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Momento de aplicación: Aplicar desde el momento que las plantas de arroz tengan 2 a 3 hojas y hasta el momento del "macollaje". En lo posible aplicar cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas.

Frecuencia de las aplicaciones: Aplicar una sola vez al año. En caso de falla del cultivo, sólo replantar con arroz. Esperar más de 300 días para sembrar otro cultivo que no sea arroz.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con otros herbicidas, tanto de contacto como residuales. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera para cosecha: 60 días.

Tiempo de reingreso: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Con equipos terrestres usar boquillas tipo abanico plano y un mínimo de 250 L/ha y con equipos aéreos usar por lo menos 50 L/ha. Utilizar equipos de pulverización que aseguren una cobertura homogénea sobre el área a tratar. La cantidad necesaria de QUINCLOGAN 50 WG se disuelve en un recipiente con agua (balde). Agregar luego esta pre-dilución al tanque de la máquina pulverizadora, con agua hasta la mitad de su capacidad. Con los agitadores en marcha completar el llenado. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia menor a 500 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, centro poblado o límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia menor a 300 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, centro poblado o límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos, cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre, en todo tipo de cultivos, a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.