



READY FER

QUELATO DE HIERRO (EDDHA HIERRO)

Composición (análisis mínimo) (% peso/peso)

N	P ₂ O ₅ (asimilable)	P ₂ O ₅ (total)	K ₂ O	Fe
0	0	0	0	6 %

Registro MGAP
Nº: 901 (203/037)

Fabricante: LAINCO S.A.
Origen: ESPAÑA

Riquezas garantizadas:

Hierro (Fe) quelado por EDDHA y soluble en agua: 6%

Hierro (Fe) quelado por o,o-EDDHA: 4,8%

Registrante: LANAFIL S.A.

Bvar. Artigas 420 Of. 105, Montevideo.

Tel.: 2710 1932 - lanafil@lanafil.com

www.lanafil.com

Lote:

Fecha de fabricación:

Contenido Neto:
5 Kg.

Generalidades: READY FER es un quelato de Hierro caracterizado por ser una fuente confiable para el suministro de hierro en forma tal que pueda ser absorbido por la planta en suelos con elevado pH y alto contenido de calcio (blanqueales). Se destina al control de "CLOROSIS FÉRRICAS" en citrus, vid, frutales de carozo y pepita, cultivos hortícolas y ornamentales. READY FER se disuelve preferentemente en agua y pasa con facilidad desde el suelo a las raíces de las plantas.

Modo de aplicación: Debido a que el hierro se absorbe a través de las raíces, READY FER se debe aplicar de manera tal que se asegure la penetración a la zona radicular de la planta. Se puede aplicar: 1) vía inyección al equipo de riego por goteo. 2) haciendo 3 a 5 hoyos de 5 a 10 cm de profundidad alrededor del tronco en la zona radicular y colocando en ellos el producto. READY FER puede aplicarse granulado tal cual o disuelto en uno o dos litros de agua por planta. Inmediatamente después se debe tapar los hoyos y regar lo más pronto posible para activar el producto, si es que no ha llovido posteriormente al tratamiento.

Momento de aplicación: La fecha de aplicación óptima de READY FER es durante la mayor actividad de las raíces y del follaje; es decir en primavera y verano.

DOSIS: En todos los casos la dosificación varía con la especie y el desarrollo de la planta a tratar, y con la intensidad de la clorosis que acusen las mismas.

CLOROSIS FÉRRICA EN:	DOSIS	OBSERVACIONES
Citrus	20 a 30 g/planta	Aplicar temprano en la primavera. Esperar 25 días para una segunda aplicación si ésta es necesaria.
Manzanos y perales Durazneros	4 a 20 g/planta	En caso de aplicar la dosis más baja se debe repetir el tratamiento una o dos veces más a intervalos de 14 días hasta la corrección del amarillamiento.
Ciruelos	4 a 8 g/planta	Primer tratamiento en la primavera temprana: si es necesario repetir cada 2 o 3 semanas.
Viña	4 a 12 g/planta	Normalmente se inician dos tratamientos consecutivos, separados 3 semanas, a 4 g/planta. Por hectárea normalmente se emplean 6 a 10 kg/hectárea.
Hortalizas y plantas ornamentales	3 a 6 Kg/por ha.	Se debe aplicar como pulverización y luego regar inmediatamente por aspersión para facilitar la incorporación al suelo.

Precauciones de empleo - Instrucciones de almacenamiento y disposición final de envases

READY FER es un producto prácticamente inocuo para el hombre y demás animales. A pesar de ello se deben tomar las precauciones siguientes: lavarse las manos y la piel expuesta luego del trabajo y antes de comer. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. READY FER se debe almacenar en un lugar seco y a la sombra. Consérvese el producto en su envase original. Cierre el recipiente luego del uso. Traslade el envase al Centro de Acopio más cercano.

"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales". "No almacene con alimentos, utensilios domésticos y vestimentas".

Nota: READY FER se elabora bajo estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios derivados por un uso diferente al indicado en este rótulo o por condiciones anormales de almacenamiento

Lanafil