



Gimondo Sebastián Anibal  
DISEÑADOR GRAFICO  
1135068494  
gimondodiseno@hotmail.com

trabajo: librito Linurex 500Flow Lanafil X 1 L  
tamaño: ancho: 275mm x alto: 148 mm  
código: ----  
fecha: 13/09/21



**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS, 2009. Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con agua abundante y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: 1722 CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **ADVERTENCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS, AVES Y ABEJAS.** No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. **A) MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** Aplicaciones foliares: No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. Situaciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La Empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan. **B) PELIGROSIDAD: TOXICIDAD PARA AVES: Moderadamente Tóxico. Medidas de mitigación:** Aplicaciones foliares: No aplicar desde madurez fisiológica en adelante. **TOXICIDAD PARA PECES: Ligeramente Tóxico. Medidas de mitigación:** Aplicaciones foliares: No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorecen la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 h de aplicación) o deriva del producto. Prohibida la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas. Evitar la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes. **TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente No-tóxico. Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano. **Instrucciones de almacenamiento:** Mantener el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO ☠ VENENO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

ADAMA  
ESSENTIALS

Linurex® 500 Flow

Ingrediente activo en peso: en volumen:  
LINURÓN 42.3 % 500 g/L.

Grupo químico: Derivado de la urea  
Suspensión Concentrada

Registro N°: 1592 - Producto autorizado por el M.G.A.P. Uso Agrícola. Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.



Fabricante: ADAMA AGAN Ltd.  
Origen: ISRAEL Registrante: LANAFIL S.A

Lote N°:

Fecha de vencimiento:

Fecha de fabricación:

Contenido Neto:

1 Litro

Lanafil



Bvar. Artigas 420 Of. 105 - Montevideo - Uruguay  
Tel: (598) 2710 1932  
lanafil@lanafil.com - www.lanafil.com

**RECOMENDACIONES DE USO:** **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**Generalidades: LINUREX 500 FLOW** es un herbicida selectivo en aplicación pre y postemergente. Es rápidamente absorbido a través de las raíces y algo también a través del follaje. Actúa inhibiendo el transporte de electrones en el proceso de la fotosíntesis. **LINUREX 500 FLOW** controla numerosas especies gramíneas y de hoja ancha. Es un herbicida indicado para usar en diversos cultivos, tales como maíz, soja, trigo, algodón, papa, zanahoria, cebolla y arvejas. No controla malezas rizomatosas o de raíces profundas.

**Instrucciones de Uso:**

| CULTIVO                                                                                                                                              | MALEZA                                            |                                                                                                                  | Dosis (L/ha) | MOMENTO DE APLICACIÓN:                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Nombre común                                      | Nombre científico                                                                                                |              |                                                                                                           |
| Zanahoria ( <i>Daucus carota</i> L.), Perejil ( <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss)                                                            | Altamisa<br>Capipul<br>Cepa cebolla<br>Manzanilla | <i>Ambrosia tenuifolia</i><br><i>Stellaria media</i><br><i>Xanthium spinosum</i><br><i>Matricaria chamomilla</i> | 1,5 a 2      | Pre-emergente. Post-emergente. Zanahoria: luego que tenga 3 hojas verdaderas. Perejil: después del corte. |
| Cebolla ( <i>Allium cepa</i> L.); Puero ( <i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>Porum</i> )                                                             | Mostaza silvestre                                 | <i>Sinapsis arvensis</i><br><i>Brassica napus</i>                                                                | 0,75 a 1,5   | Post-trasplante. Dos semanas después del trasplante.                                                      |
| Ajos ( <i>Allium sativum</i> L.)                                                                                                                     | Nabo<br>Quinoa<br>Sanguinaria                     | <i>Chenopodium album</i><br><i>Polygonum aviculare</i>                                                           | 1 a 2        | Pre-emergente. Enseguida de plantar.                                                                      |
| Habas ( <i>Vicia faba</i> L.), Arvejas ( <i>Pisum sativum</i> L.)<br>Porotos ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), Chauchas ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) | Senecio<br>Verdolaga                              | <i>Senecio vulgaris</i><br><i>Portulaca oleracea</i>                                                             | 1 a 2        | Pre-emergente. Inmediatamente después de sembrar.                                                         |
| Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)                                                                                                                  | Verdolaga                                         | <i>Amaranthus quitensis</i><br><i>Echinochloa cruz-galli</i>                                                     | 1,5 a 3      | Pre-emergente. Aplicar inmediatamente antes de la emergencia                                              |
| Soja ( <i>Glycine max</i> L.), Maní ( <i>Arachis hypogaea</i> L.),<br>Girasol ( <i>Helianthus annuus</i> L.)                                         | Yuyo colorado<br>Capin                            | <i>Setaria geniculata</i><br><i>Digitaria sanguinalis</i>                                                        | 1 a 2,5      | Pre-emergente. Sembrar profundo y aplicar inmediatamente después de la siembra                            |
| Trigo ( <i>Triticum aestivum</i> L.) y Cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> L.)                                                                           | Cola de zorro<br>Pasto blanco                     | <i>Poa annua</i>                                                                                                 | 1 a 2        | Pre-emergente. Inmediatamente después de la siembra.                                                      |
| Trigo ( <i>Triticum aestivum</i> L.)                                                                                                                 | Pasto de invierno                                 |                                                                                                                  | 1,2 a 1,6    | Post-emergente. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera y hasta antes del maclejaje.                           |

**PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:**

**SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.**

**Momento(s) de aplicación:** varía según los cultivos, las especies de malezas a combatir y el tipo de suelo. Se puede aplicar en pre-emergencia, es decir, luego de la siembra y antes del nacimiento del cultivo o en post-emergencia temprana, con malezas de no más de 4 hojas verdaderas.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** es compatible con otros herbicidas tales como Feramina, DI-ON 80 Flow y Premerlin. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o sobre dudas sobre el comportamiento físico o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

**Tiempo de espera:** 60 días.

**Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Agite bien el envase antes de usar el producto. Verter la cantidad necesaria de LINUREX 500 FLOW en el tanque del equipo aplicador, con agua hasta la mitad de su capacidad y con el agitador en marcha. Luego, sin detener el agitador, completar el llenado. El producto LINUREX 500 FLOW debe ser aplicado con equipos terrestres que aseguren una distribución homogénea en el suelo, logrando 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado, usando boquillas de abanico plano.

**No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.**

Con equipos terrestres usar boquillas tipo abanico plano, calibrando la máquina para un gasto mínimo de 200 L/ ha.

**Resol.s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011: No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.**

**No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.**

**Resol. N°129 de 27/2/2008: No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).**

**No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.**

**Nota:** Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.



CUIDADO



G092021