PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS 2009. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TEL.: (2)1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: A) Medidas Generales:** No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado, TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: **MUY ALTAMENTE TÓXICO.** Mediadas de mitigación: No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. No aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes. No aplicar dentro del área de la zona BUFFER (10 metros para aplicaciones terrestres y 30 metros para aplicaciones aéreas). **A las dosis recomendadas no presenta riesgo en organismos acuáticos.** TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO Medidas de mitigación: Evitar la deriva del producto al suelo. **Realizada la evaluación de riesgo a la dosis recomendada, el riesgo es aceptable.** C) Destino Ambiental: Solubilidad en agua: baja. Coeficiente de partición octanol/agua: alto. Volatilidad: baja. Persistencia en suelo: moderada. Persistencia en agua: baja. Movilidad en suelo: intermedia. Potencial de lixiviación: bajo. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. En el caso de Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy. **Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

CampoLimpio℠
PROGRAMA DE MANEJO DE ENVASES VACIOS

FUNGICIDA

ACTIVO 250 EC

Concentrado emulsionable

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
Difenoconazol	**23 %**	**250 g/L**

Grupo químico: **Triazol**

Grupo FRAC	3	Aptitud FUNGICIDA

Registro: Nº 2978
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en esta etiqueta.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Lote Nº: ver envase

Fecha de fabricación: ver envase

Fecha de vencimiento: ver envase

Contenido neto: 1 Litro

Fabricante: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE LTD.
País de origen: CHINA
Registrante: LANAFIL S.A.

Lanafil

Bvar. Artigas 420 Of.106/Montevideo
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: ACTIVO 250 EC es un funguicida sistémico del grupo de los triazoles, con acción preventiva y curativa. Inhibe la síntesis del ergoesterol a nivel de las membranas celulares deteniendo el desarrollo de los hongos patógenos. Cuando se absorbe por vía foliar tiene la propiedad de moverse con la savia hacia los nuevos tejidos. También tiene excelente acción de penetración translaminar. Controla el desarrollo sub-cuticular del micelio del hongo previniendo el desarrollo de los síntomas de la enfermedad.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	MOMENTO DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Científico		
Limón *(Citrus x limon (L.) Osbeck)* Mandarina *(Citrus reticulata Blanco)* Naranja *(Citrus sinensis (L.) Osbeck)* Pomelo *(Citrus grandis (L.) Osbeck)*	Sarna de los citrus	*Sphaceloma fawcetti*	Alto volumen (a punto de goteo) 20ml /100 L Volumen reducido Mínimo: 0,3 L/ha	1) Al final de caída de pétalos 2) repetir a los 30 días
Manzana *Malus domestica (L.)* Pera *Pyrus communis*	Sarna del manzano y del peral	*Venturia spp*	Alto volumen (*) 10 a 15 ml/100 L Volumen reducido Mínimo: 0.2 L/ha	Tratamientos preventivos en los momentos más críticos o en forma curativa dentro de las 96 horas siguientes al inicio del período de infección.
Caqui *(Diospyros kaki (L.))*	Alternaria	*Alternaria spp.*	20 – 30 cc/100L	Aplicar preventivamente en pre cosecha, respetando el tiempo de espera.curativa dentro de las 96 horas siguientes al inicio del período de infección.
Papa *(Solanum tuberosum) (L.))*	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.3 – 0.4 L/ha	Comenzar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.de las 96 horas siguientes al inicio del período de infección.
Tomate (Solanum lycopersicum (L.))	Tizón temprano	*Alternaria solani*	50 cc/100 L	
Frutilla *(Fragaria x ananassa Duch)*	Viruela Antracnosis	*Mycosphaerella fragariae Colletotrichum spp.*	50 cc/100 L	
Arroz *(Oryza sativa (L.))*	Manchado de la vaina Podredumbre del tallo Brusone	*Rhizoctonia oryzae Sclerotium oryzae Pyricularia grisea*	200 – 250 cc/ha Se recomienda el agregado de Mirador 25 SC (300 – 400 cc/ha)	Aplicar en el comienzo de la floración o cuando se detecte la enfermedad en el cultivo.
Arándanos *(Vaccinium myrtillus (L.))*	Oidio Botritis	*Sphaerotheca macularis Botritis cinerea*	0.2 L/ha	Aplicar en forma preventiva desde inicio de brotes y repetir según sea necesario a intervalos de 14 días, desde floración a 1 día antes de cosecha. Utilizar dentro de un programa de control que incluya productos de diferente modo de acción. Asegurar una buena cobertura del follaje, ramilletes y racimos. Utilizar un volumen máximo de 1300 L de agua /ha. Aplicar un máximo de 2 veces por temporada, alternando con fungicidas de diferente modo de acción. días, desde floración a 1 día antes de cosecha. Utilizar dentro de un programa de control que incluya productos de diferente modo de acción. Asegurar una buena cobertura del follaje, ramilletes y racimos. Utilizar un volumen máximo de 1300 L de agua /ha. Aplicar un máximo de 2 veces por temporada, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.
Olivos *(Olea europea (L.))*	Repilo	*Venturia oleaginea*	60 cc/ 100 L	Aplicar en brotaciones jóvenes durante la primavera. No aplicar más de 2 veces por año.
Morrón *(Capsicum annuum L.)*	Oidio de la arveja. Oidio del tomate	*Erysiphe polygoni Leveillula taurica*	30-50 cc/100 L	Aplicar en forma preventiva desde el inicio del cultivo. Repetir cada 10-15 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción. Utilizar la dosis máxima y el intervalo menor en condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilizar un volumen máximo de 1000 L agua/ha. Máximo 3 aplicaciones por temporada.

Modo de preparación y técnica de aplicación: ACTIVO 250 EC debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llene el depósito de la pulverizadora con agua hasta el 75% de su capacidad. Luego con el agitador en marcha agregue ACTIVO 250 EC, complete con agua y mantenga la agitación durante la aplicación. Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto y/o dependiendo del producto aplicar. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios: Resol. s/n de 14/5/2004 y Nº 188 DE 25/3/2011 No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resol. Nº129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas represas y tajamares) No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Compatibilidad y fitotoxicidad:** En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. **Tiempos de espera:** Citrus y arroz: 30 días; Manzana, pera, caqui, papa y frutilla: 14 días; tomate: 7 días; Arándanos: 14 días; Olivos: 30 días. Morrón: 3 días. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

CUIDADO