PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: CLASE II (DOS) IPCS / OMS 2019 MODERADAMENTE PELIGROSO Antídotos: No tiene antídoto. **Primeros Auxilios:** En caso de ingestión, no provocar el vómito. Contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados Contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes de nitrilo. Usar mameluco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameluco. Usar careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:** A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. B) Peligrosidad del ingrediente activo **TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MODERADAMENTE TOXICO A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable.** No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión. No sembrar a una distancia de cuerpos de agua menor a 10 metros en aplicaciones terrestres y 30 metros aplicaciones aéreas. No lavar sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos. T**OXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TOXICO A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable.** Avisar con anticipación al apicultor con colmenas dentro de los 60 m en áreas con siembras neumáticas. Usar coadyuvantes que mejoren la adherencia del producto a la semilla. **TOXICIDAD PARA AVES: ALTAMENTE TOXICO** A las dosis recomendadas, el riesgo no es aceptable. Las semillas tratadas con este producto, deberán ser enterradas en el suelo utilizando sembradoras de surco o tapadas con restos vegetales. Toda semilla tratada con este producto deberá ser cuidadosamente manejada, evitando derrames en los caminos o puntos de carga de las sembradoras. Si los hay deberán enterrarse inmediatamente para evitar el daño a las aves. **TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TOXICOA las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable.** C) Destino Ambiental: Alta solubilidad en agua. Persistente en suelo. Alta lixiviabilidad. Bajo potencial de bioacumulación. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RIGIDOS (Bidones, botellas) realice el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. En el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. **Productos vencidos y/o obsoletos:** Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092146145 o al info@campolimpio.org.uy Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer. **Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica"

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACION. EL LAVADO NO ELIMINA EL TOXICO DE LA SEMILLA TRATADA.

CURAPRID 600 FS

INSECTICIDA

Venta Exclusiva Bajo Receta Profesional

Tipo de la formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)
Composición del producto:

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
Imidacloprid	**47.6 %**	**600 g/L**

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Neonicotinoide

Grupo IRAC	4A	INSECTICIDA

Producto Autorizado por el MGAP
Registro: N° **3563.**

USO AGRÍCOLA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase
Tiempo de validez del producto (años): 2 años
Fecha de vencimiento: ver envase
Contenido: 1 Litro

Fabricante: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE LTD. Origen: CHINA

Registrante: LANAFIL S.A.

Lanafil

CampoLimpio℠ PROGRAMA DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS

Bvar. Artigas 420 Of.106/Montevideo
Tel.: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: CURAPRID 600 FS es un insecticida sistémico en la planta con prolongado efecto residual. Actuando en los insectos por ingestión y contacto. Es un modulador competitivo del receptor nicotínico de la acetilcolina (NACHR). Se une al sitio de acetilcolina en los nAChR, causando una variedad de síntomas, desde hiperexcitación hasta letargo y parálisis. La acetilcolina es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central de los insectos.

Instrucciones de uso:

CULTIVOS	PLAGAS CONTROLADAS		DOSIS (cc/100 Kg (semilla)
	Nombre común	Nombre científico	
Trigo *(Triticum aestivum L.)*	Bicho torito	*Dilobaderus abderus*	120
Cebada *(Hordeum vulgare L.)*	Isoca chica	*Cyclocephala signaticollis*	
Avena *(Avena sativa L.)*	Gusano alambre	*Conoderus spp.*	
Sorgo *(Sorghum bicolor (L.) Moench.)*	Grillos topos	*Scapteriscus spp.*	300
Raigrás anual*(Lolium multiflorum Lam.)*	Pulgón de la espiga	*Sitobion avanae*	
Girasol *(Helianthus annuus L.)*	Pulgón verde de los cereales	*Schizaphis graminum*	500
Alfalfa *(Medicago sativa L.)*	Hormigas	*Acromyrmex spp.*	500
Maíz *(Zea mays L.)*			
Maíz *(Zea mays L.)*	Chicharrita del maiz	*Dalbulus maidis*	800

Momento(s) de aplicación: Se aplica a la semilla previo a la siembra. **Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde:** Una aplicación previa a la siembra. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Para trigo, cebada y avena: agregar 1,5 % de agua para homogeneizar. Para sorgo y raigrás anual: agregar 2 % de agua para homogeneizar. Para maíz y alfalfa: Agregar 0.5 a 1.0 % de agua para homogeneizar. Aplicar con equipos adecuados que, mediante movimientos de rotación, permitan la total cobertura de la semilla a tratar. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios Resol. N°129 de 27/2/2008 - Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. Compatibilidad y fitotoxicidad:** En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. **Tiempos de espera:** No corresponde por su forma de uso. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No corresponde por su forma de uso. **Otras informaciones necesarias respecto al uso: Lavado de equipo post-aplicación:** En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible. Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se direccione a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo. **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.

NOCIVO