

INFINIT

Agrandamos el portfolio: Fungicida sistémico

COMPOSICIÓN g/L

Fluopicolida 62,5
Propamocarb 625
clorhidrato

Suspensión Concentrada.

INFINIT es un fungicida sistémico compuesto por dos principios activos con diferente modo de acción (Fluopicolide 62,5 g/L + Clorhidrato de propamocarb 625 g/L) para el control de hongos de la familia Oomycetes, como los hongos del género *Phytophthora* sp.

Actúa en diversas fases del desarrollo de los hongos. Se recomienda su aplicación cuando las condiciones sean predisponentes para la aparición de la enfermedad.

- **Propamocarb:** Fungicida sistémico del grupo de los carbamatos. Afecta el crecimiento micelial de los hongos, la producción y la germinación de las esporas. Interfiere en la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos, alterando la formación de membranas celulares.
- **Fluopicolide:** Acción translaminar, fundamentalmente de carácter preventivo, también posee efecto curativo y antiesporulante. Actúa inhibiendo el desarrollo de la pared celular del hongo interfiriendo en la formación de las membranas plasmáticas.

➤➤➤ DOSIS Y USOS REGISTRADOS

PAPA (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	1,2 – 1,6 L/ha
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i> L.)	200 – 250 cc/100 L
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	200 – 250 cc/100 L
MORRÓN (<i>Capsicum annum</i> L.)	200 – 250 cc/100 L
MELÓN (<i>Cucumis melo</i> L.)	200 – 250 cc/100 L

➤➤➤ FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES

Papa: hasta 3 aplicaciones consecutivas con intervalos entre aplicaciones entre 7 y 12 días. **Cebolla:** hasta 3 aplicaciones espaciadas entre 7 y 10 días. **Otros:** no más de 3 aplicaciones por temporada.

➤➤➤ TIEMPO DE ESPERA PARA COSECHA

Papa y Tomate: 7 días. **Melón y Morrón:** 14 días. **Cebolla:** 21 días.

➤➤➤ TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO

No ingresar al cultivo hasta transcurrir como mínimo 24 horas.